

全国各类成人高等学校招生考试

专科起点升本科

医学综合全真模拟试卷(六)

(考试时间 120 分钟)

题 号	一	二	三	总 分	
题 分	105	30	15	核分人	
得 分				复查人	

得 分	评卷人	复查人

一、A 型题:1~84 小题,每小题 1.25 分,共 105 分。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

- 三角瓶形心脏见于
A. 主动脉瘤 B. 冠心病 C. 肺心病
D. 心包大量积液 E. 心肌炎
- 下列哪种情况不会出现腹部膨隆
A. 肠梗阻 B. 脱水 C. 腹水
D. 肠麻痹 E. 气腹
- 浅反射不包括
A. 角膜反射 B. 腹壁反射 C. 提睾反射
D. 跟腱反射 E. 跖反射
- 腭扁桃体的位置在
A. 喉前庭的侧壁 B. 鼻咽部的侧壁 C. 喉咽部的侧壁
D. 口腔的侧壁 E. 口咽部的侧壁
- 右锁骨中线与右肋弓交点稍下方的是
A. 胆囊管的体表投影 B. 胆囊颈的体表投影 C. 胆囊底的体表投影
D. 胆囊体的体表投影 E. 幽门的体表投影
- 属于腹膜内位的器官是
A. 肝 B. 胆囊 C. 胃
D. 胰 E. 子宫
- 正常情况下,肾脏维持体内水平衡的功能主要通过
A. 改变肾小球滤过率 B. 改变近球小管对水的重吸收
C. 改变髓袢对水的重吸收 D. 改变肾小管的分泌功能
E. 改变远曲小管和集合管对水的重吸收
- 醛固酮的主要作用是
A. 保 K^+ 排 Na^+ B. 保 Na^+ 排 K^+ C. 保 Na^+ 保 K^+
D. 保 Na^+ 排 H^+ E. 保 K^+ 排 H^+

9. 下列哪项引起的呼吸困难不是吸气性呼吸困难 【 】
- A. 白喉 B. 喉癌 C. 气管异物
- D. 气管肿瘤 E. 慢性阻塞性肺气肿
10. 前列腺的位置是在 【 】
- A. 包绕尿道球部 B. 膀胱底与直肠之间 C. 尿生殖膈下方
- D. 包绕尿道膜部 E. 耻骨联合与直肠之间
11. 输卵管外侧端的开口部位在 【 】
- A. 卵巢 B. 腹膜腔 C. 卵巢窝
- D. 腹腔 E. 阴道后穹
12. 肺动脉的发出部位是 【 】
- A. 左心房 B. 右心房 C. 右心室
- D. 左心室 E. 右心耳
13. 心正常的起搏点是 【 】
- A. 窦房结 B. 房室结 C. 房室束
- D. 束支 E. 浦肯野纤维
14. 肱骨中部骨折时易损伤 【 】
- A. 正中神经 B. 腋神经 C. 桡神经
- D. 尺神经 E. 肌皮神经
15. 维持机体稳态的重要途径是 【 】
- A. 正反馈 B. 负反馈 C. 神经调节
- D. 自身调节 E. 体液调节
16. 支配小腿后群肌的神经是 【 】
- A. 胫神经 B. 股神经 C. 腓浅神经
- D. 闭孔神经 E. 腓深神经
17. 舌的味觉障碍可能受损的神经是 【 】
- A. 面神经 B. 三叉神经 C. 迷走神经
- D. 舌下神经 E. 副神经
18. 位于额中回后部的中枢是 【 】
- A. 视区 B. 书写中枢 C. 听区
- D. 运动性语言中枢 E. 感觉性语言中枢
19. 对于心源性水肿描述不准确的是 【 】
- A. 常伴颈静脉怒张 B. 常伴肝肿大 C. 常伴静脉压升高
- D. 常伴低蛋白血症 E. 严重时出现胸腹水
20. 一位左侧胸痛的患者坐位时在左下胸部叩诊鼓音,多考虑是 【 】
- A. 左侧气胸 B. 肺气肿 C. 胸腔积液
- D. 肋间神经痛 E. 正常胃泡
21. 下列哪些不属于全身性水肿 【 】
- A. 心源性水肿 B. 肝源性水肿 C. 营养不良性水肿
- D. 肾源性水肿 E. 过敏性水肿
22. 自身调节情况下对刺激产生反应的类型是 【 】
- A. 应激反应 B. 旁分泌反应 C. 自分泌反应
- D. 应急反应 E. 适应性反应
23. 钠泵活动最重要的生理意义是 【 】

- A. 储备势能 B. 调节 ATP 分解量 C. 维持完整细胞结构
D. 维持细胞外液高钾 E. 维持细胞外液高钙
24. 动作电位到达神经末梢,引起的与末梢膜释放递质有关的离子流是 【 】
A. K^+ 内流 B. Cl^- 内流 C. Na^+ 内流
D. Ca^{2+} 内流 E. Mg^{2+} 外流
25. 手术后发生恶心、呕吐,最常见的原因是 【 】
A. 麻醉反应 B. 颅内高压 C. 水、电解质失衡
D. 尿毒症 E. 急性胃扩张
26. 下列哪些不是输血的适应症 【 】
A. 大出血 B. 严重感染 C. G-6-PD 酶缺乏
D. 凝血异常 E. 贫血
27. 补充营养的主要途径是 【 】
A. 胃肠外营养 B. 胃肠内营养 C. 口服
D. 静脉注射 E. 肌注
28. 动脉血压升高时心动周期主要的变化是 【 】
A. 等容收缩期延长 B. 房缩期延长 C. 快速射血期延长
D. 减慢射血期延长 E. 心室舒张期延长
29. 可引起心率减慢的调节因素是 【 】
A. 迷走活动增强 B. 交感活动增强 C. 肾上腺素增多
D. 甲状腺激素增多 E. 血管紧张素增多
30. 正常人平静呼气末胸膜腔内承受的压力是 【 】
A. 大气压—非弹性阻力 B. 大气压—弹性阻力 C. 大气压—肺回缩压
D. 大气压+表面张力 E. 大气压+肺回缩压
31. 恶性肿瘤淋巴结转移之淋巴结特点正确的是 【 】
A. 柔软、有压痛 B. 表面光滑无粘连
C. 质地坚硬有橡皮样感 D. 肿大到一定程度即可缩小、消退
E. 只发生在颈部血管周围
32. 双侧瞳孔缩小见于 【 】
A. 阿托品中毒 B. 青光眼 C. 濒死状态
D. 有机磷中毒 E. 以上都不是
33. 诊断淤斑最正确的皮肤改变是 【 】
A. 皮下出血直径不超过 2mm B. 皮下出血直径为 3~5mm
C. 皮下出血直径 5mm 以上 D. 片状出血伴有皮肤显著隆起
E. 稍隆起于皮面的苍白或红色局限性水肿
34. 颅内高压性呕吐的特点是 【 】
A. 呕吐伴明显恶心 B. 餐后呕吐 C. 晨起呕吐
D. 喷射性呕吐 E. 夜间呕吐
35. 毁损视上核,尿液监测指标的变化是 【 】
A. 低渗、量增加 B. 高渗、量不变 C. 等渗、量减少
D. 尿颜色加深、pH 值升高 E. 尿蛋白和糖均阳性
36. 抗利尿激素促进水重吸收的部位是 【 】
A. 肾小球 B. 近曲小管和髓袢粗段 C. 远曲小管和集合管
D. 髓袢细段升降支 E. 肾小囊

37. 血沉增快可见于 【 】
 A. 心绞痛 B. 血液浓缩 C. 活动性肺结核
 D. 真性红细胞增多症 E. 良性肿瘤
38. 代谢性酸中毒最突出的表现是 【 】
 A. 面色潮红 B. 神志改变 C. 呼吸深而快
 D. 对称性肌张力减弱 E. 腱反射消失
39. 抗休克的首要基本措施是 【 】
 A. 改善周围血管张力 B. 改善心功能不全 C. 防止肾功能衰竭
 D. 补充血容量 E. 防止 DIC 出现
40. 破伤风最早出现强烈收缩的肌肉是 【 】
 A. 四肢肌 B. 面肌 C. 颈项肌
 D. 呼吸肌 E. 咀嚼肌
41. 下列属于腺垂体激素的是 【 】
 A. 生长激素 B. 甲状腺素 C. 缩宫素
 D. 血管升压素 E. 生长抑素
42. 参与应激反应的最主要激素是 【 】
 A. 胰岛素 B. 催产素 C. 醛固酮
 D. 皮质醇 E. 促黑激素
43. 各种组织和器官损伤的基本病理变化是 【 】
 A. 局部充血 B. 局部肿胀 C. 局部发热
 D. 局部炎症反应 E. 局部血浆渗出
44. 患者为缺铁性贫血,检查时常见有 【 】
 A. 杵状指 B. 匙状指 C. 膝内翻
 D. 水肿 E. 肢端肥大
45. 检查昏迷患者出现下列情况,支持瘫痪的是 【 】
 A. 给予刺激不动 B. 抬高肢体自然坠落
 C. 双下肢屈曲立于床上不能伸直 D. 一侧小腿、足部内收位
 E. 一侧小腿、足部外旋位
46. 超声心动图诊断左房黏液瘤的主要依据是 【 】
 A. 左房增大 B. 右室增大 C. EF 斜率减慢
 D. 舒张期二尖瓣前叶的后方有团状或雾状回声反射
 E. 二尖瓣前后叶呈逆向运动
47. 男,50 岁。间断反酸,规律性剑突下疼痛 2 年,排柏油样便 2 天。最可能的诊断是 【 】
 A. 急性糜烂出血性胃炎 B. 胃癌伴消化道出血 C. 消化性溃疡并出血
 D. 贲门黏膜撕裂综合征 E. 食管静脉曲张破裂出血
48. 女,68 岁。进油腻性食物后出现右上腹绞痛,向背部放射伴呕吐 2 天就诊。血生化:ALT102U/L,AST98U/L,血胆红素升高,以直接胆红素升高为主,尿胆红素阳性。引起胆红素升高最可能的原因是 【 】
 A. 急性肝炎 B. 胆系结石 C. 尿路结石
 D. 急性胰腺炎 E. 自身免疫性溶血性贫血
49. 下列皮肤改变中检查不出皮块的是 【 】
 A. 血肿 B. 丘疹 C. 荨麻疹

- D. 水泡 E. 斑疹
50. 下列对甲状腺描述不准确的是 【 】
 A. 正常人甲状腺外观不明显 B. 检查时可嘱患者做吞咽动作
 C. 肿大达胸锁乳突肌内侧为Ⅲ度 D. 看不到能触及为Ⅰ度
 E. 甲亢时甲状腺可肿大
51. 低血钙患者肌肉兴奋增加,可发生手足肌肉紧张性痉挛,称为 【 】
 A. 摹空症 B. 手足徐动症 C. 手足搐搦
 D. 手指震颤 E. 舞蹈样运动
52. 显微镜下血尿是指尿液外观无血色,尿沉渣镜检红细胞大于 【 】
 A. 1个/HP B. 2个/HP C. 3个/HP
 D. 4个/HP E. 5个/HP
53. 引起肝浊音界消失最常见的原因是 【 】
 A. 胃肠穿孔 B. 肺气肿 C. 间位结肠
 D. 肠梗阻 E. 内脏转位
54. 男,23岁。因发热、呼吸困难2周就诊。查体:颈静脉怒张,心音遥远,心界向两侧扩大。最可能的诊断是 【 】
 A. 感染性心内膜炎 B. 结核性心包炎 C. 风湿性心脏瓣膜病
 D. 原发性高血压 E. 肥厚型心肌病
55. 有关健康肉芽组织的标准,下列哪项是错误的 【 】
 A. 创面平浅 B. 创面鲜红色 C. 创面呈细颗粒状
 D. 创面分泌物少 E. 创面不易出血
56. 酸性磷酸酶在下列哪种肿瘤中可升高 【 】
 A. 肝癌 B. 骨肉瘤 C. 前列腺癌
 D. 恶性淋巴瘤 E. 胃癌
57. 对诊断门脉高压特异性最强的体征为 【 】
 A. 腹水 B. 肝颈静脉回流征阳性
 C. 脾大 D. 脐部静脉曲张 E. 肝大
58. 最难预防的输血引起的肝炎是 【 】
 A. 甲肝 B. 乙肝 C. 丙肝
 D. 丁肝 E. 戊肝
59. 某患者因上腹痛就诊。查体:按压右肋弓与腹直肌外缘交界处,患者深呼气因疼痛而受限。最可能的诊断是 【 】
 A. 十二指肠溃疡 B. 下尿路感染 C. 急性胆囊炎
 D. 急性胰腺炎 E. 胆管结石
60. 大量胸腔积液的典型体征是 【 】
 A. 病变侧呼吸动度加大 B. 病变侧叩诊实音 C. 气管偏向患侧
 D. 病变部位可闻及啰音 E. 语音共振增强
61. 输血最常见的早期并发症 【 】
 A. 发热反应 B. 过敏反应 C. 溶血反应
 D. 细菌污染反应 E. 循环超负荷
62. 重度营养不良是指体重低于标准体重 【 】
 A. 10% B. 20% C. 30%
 D. 40% E. 50%

63. 对放射线高度敏感的肿瘤是 【 】

- A. 来自上皮的恶性肿瘤 B. 淋巴造血系统和某些胚胎组织的恶性肿瘤
C. 软组织恶性肿瘤 D. 骨组织恶性肿瘤 E. 黑色素瘤

64. 我国消化道肿瘤发病率占首位的是 【 】

- A. 食管癌 B. 胃癌 C. 胰腺癌
D. 肝癌 E. 直肠癌

65. 女, 80岁。头晕、心悸就诊。心电图如下。最可能的诊断是 【 】



- A. 窦性心动过缓 B. 二度I型房室传导阻滞 C. 三度房室传导阻滞
D. 二度II型房室传导阻滞 E. 窦房传导阻滞

66. 原发性甲状腺功能亢进患者颈部检查的体征是 【 】

- A. 触及甲状腺区震颤 B. 触诊甲状腺橡皮感 C. 触及甲状腺结节
D. 触及颈部淋巴结肿大 E. 甲状腺明显触痛

67. 发绀主要为血液中还原血红蛋白的绝对量超过 【 】

- A. 200g/L B. 100g/L C. 50g/L
D. 20g/L E. 10g/L

68. 判定患者有无共济失调可通过 【 】

- A. 有无震颤 B. 跟膝胫试验 C. 软瘫试验
D. 有无病理征 E. 腱反射亢进

69. 在心电图上测得 P—P 间期为 0.75s, 则被测者的心率应为 【 】

- A. 65 次/分 B. 70 次/分 C. 75 次/分
D. 80 次/分 E. 85 次/分

70. 下列试验中哪一项对诊断急性肝炎最敏感 【 】

- A. 血清蛋白电泳 B. 血清黄疸指数 C. 血清胆固醇
D. 谷丙转氨酶 E. 碱性磷酸酶

71. 术前准备中, 下列处理错误的是 【 】

- A. 心力衰竭的患者需控制 3~4 周后才实行手术
B. 血浆白蛋白测定低于 30g/L, 则术前需肠内或肠外营养支持
C. 肝功能损害者经治疗好转后方可手术
D. 糖尿病患者手术前应将血糖控制到正常
E. 肾功能重度损害者在有效的透析后仍能耐受手术

72. 注射破伤风抗毒素(TAT)的目的是 【 】

- A. 中和游离毒素 B. 对易感人群进行预防接种
C. 杀灭伤口中繁殖的破伤风梭菌 D. 简化伤口处理程序
E. 中和与神经细胞结合的毒素

73. 病理性脊柱侧凸见于 【 】

- A. 骨质退行性变 B. 佝偻病 C. 胸椎结核
D. 大量腹腔积液 E. 脊髓灰质炎后遗症

74. 检查患者颈项强直, 凯尔尼格征阳性, 应考虑 【 】

- A. 颅内感染 B. 脑实质出血 C. 颅内肿瘤
D. 椎体束受损 E. 脑血栓形成

75. 下列哪种情况在常规导联心电图上不出现典型心肌梗死图形 【 】
- A. 心内膜下心肌梗死 B. 前壁心肌梗死 C. 下壁心肌梗死
D. 正后壁心肌梗死 E. 侧壁心肌梗死
76. 超声诊断早孕的依据是 【 】
- A. 子宫增大 B. 宫内有妊娠囊 C. 孕囊内有胚芽
D. 胚芽内有搏动 E. 有胎体活动
77. 成人心肺复苏时,胸外按压与人工呼吸的比例是 【 】
- A. 30 : 2 B. 30 : 1 C. 30 : 3
D. 30 : 4 E. 30 : 5
78. 男,40岁。右小腿肿胀、痛2天来诊。查体:右小腿可见长13cm细红色线,压痛明显。该患者可能的诊断是 【 】
- A. 急性淋巴管炎 B. 丹毒 C. 急性蜂窝织炎
D. 静脉炎 E. 淋巴结炎
79. 胃大部切除术后8天拆线,切口有轻度炎症反应,2天后切口炎症消失,该切口愈合属于 【 】
- A. I类甲级 B. II类甲级 C. I类乙级
D. II类乙级 E. III类乙级
80. 输血后非溶血性发热反应的常见原因是 【 】
- A. 污染 B. 感染 C. 过敏反应
D. 致热原 E. 血液凝结
81. 诊断急性呼吸窘迫综合征最重要的措施是 【 】
- A. X线胸片有广泛性点片状阴影 B. 心电图描图
C. 肺部听诊有啰音 D. 血气分析为低氧血症
E. 一般吸氧疗法无效
82. 完全禁食数日,蛋白质分解主要来自 【 】
- A. 肌肉 B. 脂肪组织 C. 肝脏
D. 血液 E. 皮下组织
83. 出现血容量不足的症状时,提示在短时期内体液丧失至少达体重的百分数是 【 】
- A. 5% B. 3% C. 10%
D. 15% E. 20%
84. 初期心肺复苏的任务和步骤归纳为“CAB”,其“B”的含义是 【 】
- A. 保持呼吸道通畅 B. 有效的人工通气 C. 建立紧急医疗服务系统
D. 早期识别 E. 建立有效的人工循环

得分	评卷人	复查人

二、B型题:85~108小题,每小题1.25分,共30分。A、B、C、D、E是其下两道小题的备选项,每个小题只能从中选择一个最符合题目要求的答案。每个选项可以被选择一次,两次或不被选择。

- A. 虹膜 B. 脉络膜 C. 睫状体
D. 晶状体 E. 玻璃体
85. 眼前房与后房的分界 【 】
86. 产生房水的部位 【 】
- A. 空肠 B. 十二指肠 C. 横结肠
D. 乙状结肠 E. 盲肠

87. 包绕胰头的是 【 】
88. 位于右髂窝内的是 【 】
- A. 十二指肠上部 B. 十二指肠降部 C. 十二指肠水平部
- D. 十二指肠升部 E. 十二指肠空肠曲
89. 胆总管和胰管的共同开口部位为 【 】
90. 十二指肠溃疡好发的部位为 【 】
- A. 4~5 天 B. 6~7 天 C. 8~10 天
- D. 12 天 E. 14 天
91. 头面部、颈部伤口拆线时间 【 】
92. 上腹部、背部伤口拆线时间 【 】
- A. 关节面 B. 关节囊 C. 关节腔
- D. 关节盘 E. 关节唇
93. 起连接作用的关节的基本结构是 【 】
94. 扩大关节窝的关节的辅助结构是 【 】
- A. μ 波 B. β 波 C. δ 波
- D. θ 波 E. α 波
95. 婴儿期在枕叶常见到的脑电波是 【 】
96. 正常成人清醒安静并闭眼时在枕叶可记录的脑电波是 【 】
- A. 抗利尿激素分泌减少 B. 血浆胶体渗透压降低 C. 血浆晶体渗透压升高
- D. 肾小管液溶质浓度增高 E. 尿量变化不明显
97. 静脉注射 50% 葡萄糖 100ml 引起 【 】
98. 一次性饮水 1000mL 主要引起 【 】
- A. 辐射 B. 对流 C. 传导
- D. 蒸发 E. 呼吸
99. 风速影响何种散热方式 【 】
100. 脂肪较多可影响何种散热方式 【 】
- A. $WBC 9.5 \times 10^9/L, NO. 68$ B. $WBC 14 \times 10^9/L, NO. 92$
- C. $WBC 3.8 \times 10^9/L, NO. 42$ D. $WBC 8 \times 10^9/L, NO. 88$
- E. $WBC 7.0 \times 10^9/L, NO. 88$
101. 符合典型急性化脓性阑尾炎的血常规结果是 【 】
102. 符合典型病毒性肺炎的血常规结果是 【 】
- A. 弹性贮器血管 B. 阻力血管 C. 交换血管
- D. 容量血管 E. 短路血管
103. 毛细血管属于 【 】
104. 主动脉属于 【 】
- A. 渗透和滤过 B. 主动转运 C. 入胞作用
- D. 单纯扩散 E. 易化扩散
105. 水分在小肠的吸收机制为 【 】
106. 氨基酸和葡萄糖在小肠的吸收机制为 【 】
- A. 气胸 B. 低血糖 C. 电解质紊乱
- D. 脓毒症 E. 腹泻
107. 肠内营养常见的并发症是 【 】
108. 肠外营养可能会发生的并发症是 【 】

得分	评卷人	复查人

三、X 型题:109~120 小题,每小题 1.25 分,共 15 分。在每个小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,至少有两项是符合题目要求的,多选或少选均不得分。

109. 心的位置 【 】
 A. 心包腔内 B. 胸腔的中纵隔内 C. 前方对向胸骨体和第 2~6 肋
 D. 后方平对第 5~8 胸椎 E. 上连出入心的大血管
110. 下列属于腹腔干分支的有 【 】
 A. 胃右动脉 B. 胃左动脉 C. 肝总动脉
 D. 回结肠动脉 E. 脾动脉
111. 结肠、直肠的术前准备正确的是 【 】
 A. 手术前 3 天每日灌肠 B. 手术前 3 天开始口服抗生素
 C. 手术前禁食 3 天 D. 手术前晚清结灌肠 E. 以上都不对
112. 浅部触诊法,一般适用于检查 【 】
 A. 关节 B. 阴囊 C. 肝脾
 D. 胃肠 E. 胰腺
113. CO₂ 在血液中运输的形式有 【 】
 A. 和水结合形成碳酸 B. 物理溶解 C. 形成碳酸氢盐
 D. 形成碳氧血红蛋白 E. 形成氨基甲酰血红蛋白
114. 下列哪些疾病可出现舒张期奔马律 【 】
 A. 高血压性心脏病 B. 心肌炎 C. 心肌病
 D. 冠心病 E. 肺气肿
115. 下列哪些疾病可引起血尿 【 】
 A. 肾结核 B. 肾结石 C. 急性肾炎
 D. 蚕豆病 E. 阵发性血红蛋白尿
116. 基础状态是指 【 】
 A. 清晨静卧 B. 禁食 12 小时 C. 安静
 D. 环境温度等于皮肤温度 E. 清晨睡眠
117. 调节血钙浓度的激素有 【 】
 A. 甲状旁腺激素 B. 甲状腺激素 C. 肾上腺素
 D. 维生素 D₃ E. 降钙素
118. 影响创伤局部愈合的因素有 【 】
 A. 伤口感染 B. 损伤范围大 C. 异物残留
 D. 局部血液循环障碍 E. 坏死组织多
119. 外科感染的结局是 【 】
 A. 局限吸收 B. 形成脓肿 C. 转为慢性感染
 D. 感染扩散 E. 以上都不是
120. 下列选项中,属于恶性肿瘤的有 【 】
 A. 精原细胞瘤 B. 血管瘤 C. 神经母细胞瘤
 D. 脂肪瘤 E. 神经纤维瘤

医学综合全真模拟试卷(六)参考答案

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. B | 3. D | 4. E | 5. C | 6. C |
| 7. E | 8. B | 9. E | 10. E | 11. B | 12. C |
| 13. A | 14. C | 15. B | 16. A | 17. A | 18. B |
| 19. D | 20. E | 21. E | 22. E | 23. A | 24. D |
| 25. A | 26. C | 27. B | 28. A | 29. A | 30. C |
| 31. C | 32. D | 33. C | 34. D | 35. A | 36. C |
| 37. C | 38. C | 39. D | 40. E | 41. A | 42. D |
| 43. D | 44. B | 45. E | 46. D | 47. C | 48. B |
| 49. B | 50. C | 51. C | 52. C | 53. A | 54. B |
| 55. E | 56. C | 57. D | 58. C | 59. C | 60. B |
| 61. A | 62. C | 63. B | 64. B | 65. C | 66. A |

- | | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 67. C | 68. B | 69. D | 70. D | 71. D | 72. A |
| 73. B | 74. A | 75. D | 76. B | 77. A | 78. A |
| 79. D | 80. D | 81. D | 82. A | 83. A | 84. B |
| 85. D | 86. B | 87. B | 88. E | 89. B | 90. A |
| 91. A | 92. C | 93. B | 94. E | 95. D | 96. E |
| 97. D | 98. A | 99. B | 100. C | 101. B | 102. C |
| 130. C | 104. A | 105. A | 106. B | 107. E | 108. A |
| 109. BDE | 110. BCE | 111. BD | 112. AB | 113. BCE | 114. ABCD |
| 115. ABC | 116. ABC | 117. ADE | 118. ACDE | 119. ABCD | 120. AC |