

全国各类成人高等学校招生考试

专科起点升本科

医学综合全真模拟试卷(五)

(考试时间 120 分钟)

题 号	一	二	三	总 分	
题 分	105	30	15	核分人	
得 分				复查人	

得 分	评卷人	复查人

一、A 型题:1~84 小题,每小题 1.25 分,共 105 分。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

- 下列属于躯干骨的是 【 】
 - 锁骨
 - 胸骨
 - 肩胛骨
 - 舌骨
 - 髌骨
- 能作屈、伸、收、展和旋转运动的关节是 【 】
 - 距小腿关节
 - 肘关节
 - 桡腕关节
 - 膝关节
 - 肩关节
- 形成腹股沟韧带的结构是 【 】
 - 腹内斜肌和腹横肌下缘合成
 - 腹内斜肌腱膜
 - 腹横肌腱膜
 - 腹内斜肌和腹横肌腱膜合成
 - 腹外斜肌腱膜
- 喉腔炎症时,易发生水肿的部位是 【 】
 - 喉前庭
 - 喉中间腔
 - 喉室
 - 声门下腔
 - 以上都不是
- 关于左肺形态的叙述,下列选项错误的是 【 】
 - 只有两叶
 - 比右肺短
 - 比右肺窄
 - 前缘有切迹
 - 后缘圆钝
- 右侧第 12 肋斜过 【 】
 - 右肾的上方
 - 右肾后面的上部
 - 右肾后面的中部
 - 右肾后面的下部
 - 以上都不对
- 不是与膀胱的后方相毗邻的结构是 【 】
 - 精囊
 - 直肠
 - 前列腺
 - 阴道(女性)
 - 以上都不是
- 与肺尖相对应的壁胸膜是 【 】
 - 肋胸膜
 - 膈胸膜
 - 胸膜顶
 - 纵隔胸膜
 - 肋膈隐窝
- 包被于肾实质表面的结构是 【 】

- A. 肾筋膜
D. 肾周围脂肪
- B. 肾纤维囊
E. 脏腹膜
- C. 肾脂肪囊
10. 产科学经子宫的何部作剖腹取胎术 【 】
A. 子宫体
B. 子宫颈阴道上部
C. 子宫峡
D. 子宫底
E. 以上都不对
11. 下列属于长骨的是 【 】
A. 肋骨
B. 胸骨
C. 跟骨
D. 指骨
E. 锁骨
12. 通过横突孔的是 【 】
A. 脊神经
B. 颈内动脉
C. 颈内静脉
D. 迷走神经
E. 椎静脉
13. 属于升主动脉的分支是 【 】
A. 右锁骨下动脉
B. 左颈总动脉
C. 右颈总动脉
D. 左锁骨下动脉
E. 冠状动脉
14. 下列属于胸主动脉分支的是 【 】
A. 头臂干
B. 肺动脉
C. 冠状动脉
D. 肋间后动脉
E. 椎动脉
15. 下列属于肠系膜下动脉分支的是 【 】
A. 回结肠动脉
B. 右结肠动脉
C. 左结肠动脉
D. 中结肠动脉
E. 空肠动脉
16. 髋关节的关节囊最薄弱的部位在其 【 】
A. 后上部
B. 后下部
C. 前上部
D. 前下部
E. 以上都不对
17. 使肩关节内收的肌是 【 】
A. 胸小肌
B. 胸大肌
C. 前锯肌
D. 冈上肌
E. 以上都不是
18. 腋窝是 【 】
A. 三角肌后部纤维
B. 小圆肌
C. 肩胛下肌
D. 冈下肌
E. 以上都不是
19. 止于肱骨小结节的肌是 【 】
A. 冈上肌
B. 冈下肌
C. 肩胛下肌
D. 小圆肌
E. 以上都不是
20. 眼球血管膜最肥厚部分是 【 】
A. 睫状体
B. 虹膜
C. 脉络膜
D. 巩膜
E. 视网膜
21. 下列属于内耳结构的是 【 】
A. 鼓室
B. 鼓膜
C. 乳突小房
D. 咽鼓管
E. 耳蜗
22. 属于颈内动脉发出的分支是 【 】
A. 大脑中动脉
B. 大脑后动脉
C. 迷路动脉
D. 小脑上动脉
E. 基底动脉
23. 营养胃底的动脉是 【 】
A. 脾动脉
B. 胃短动脉
C. 胃左动脉

- D. 胃右动脉 E. 以上都不是
24. Murphy 征阳性见于 【 】
 A. 急性肝炎 B. 急性胆囊炎 C. 急性腹膜炎
 D. 急性胃炎 E. 急性胆管炎
25. 眼球壁的中膜中最肥厚的部分是 【 】
 A. 虹膜 B. 睫状体 C. 脉络膜后部
 D. 晶状体 E. 以上都不是
26. 凝血酶的主要作用是 【 】
 A. 加速因子Ⅷ复合物的形成 B. 使纤维蛋白原转变为纤维蛋白
 C. 加速凝血酶原复合物的形成 D. 激活因子Ⅲ和Ⅻ E. 激活血小板第3因子
27. 下列与心指数直接相关的参数是 【 】
 A. 体重 B. 年龄 C. 体表面积
 D. 身高 E. 能量
28. 动脉血压升高时心动周期主要的变化是 【 】
 A. 等容收缩期延长 B. 房缩期延长 C. 快速射血期延长
 D. 减慢射血期延长 E. 心室舒张期延长
29. 动眼神经不支配 【 】
 A. 上直肌 B. 下直肌 C. 上斜肌
 D. 下斜肌 E. 以上都不对
30. 眼睑下垂是由于损伤了 【 】
 A. 眼神经 B. 面神经 C. 动眼神经
 D. 滑车神经 E. 以上都不对
31. 颅腔内听神经瘤最容易压迫的神经是 【 】
 A. 三叉神经 B. 展神经 C. 面神经
 D. 迷走神经 E. 以上都不是
32. 刺激缩胆囊素释放的最强因素是 【 】
 A. 脂肪酸 B. 促胃液素 C. 乙酰胆碱
 D. 葡萄糖 E. 蛋白质分解产物
33. 参与脂肪消化和吸收的主要胆汁成分是 【 】
 A. 胆盐 B. 阴离子 C. 胆同醇
 D. 胆色素 E. 磷脂酰胆碱
34. 正常成年人代谢率最低的情况见于 【 】
 A. 清醒平卧 B. 熟睡 C. 闭目思考
 D. 深呼吸 E. 餐前半小时
35. 下列生理过程中,属于负反馈调节的是 【 】
 A. 排尿反射 B. 减压反射 C. 分娩
 D. 血液凝固 E. 以上都不是
36. 骨骼肌兴奋—收缩耦联中起关键作用的离子是 【 】
 A. Na^+ B. K^+ C. Ca^{2+}
 D. Cl^- E. Mg^{2+}
37. 神经细胞动作电位上升支是由于 【 】
 A. K^+ 内流 B. Cl^- 外流 C. Na^+ 内流
 D. Na^+ 外流 E. K^+ 外流

38. 脊髓前角 α 神经元兴奋, 可引起的变化是 【 】
 A. 腱器官传入冲动减少 B. 梭内肌收缩 C. γ 传出冲动增加
 D. 梭外肌收缩 E. 肌梭传入冲动增加
39. 下列属于脑高级功能活动的是 【 】
 A. 非条件反射 B. 视听觉 C. 饥渴觉
 D. 平衡觉 E. 短时记忆
40. 突触前抑制时, 与突触活动有关的变化是 【 】
 A. 突触前膜超极化 B. 兴奋性突触后电位减小
 C. 突触前膜不释放神经递质 D. 抑制性突触后电位增大
 E. 到达轴突末梢的兴奋减少
41. 心肌细胞中, 传导速度最慢的是 【 】
 A. 心房肌 B. 房室交界区 C. 左、右束支
 D. 浦肯野纤维 E. 心室肌
42. 下列物质中, 舒血管作用最强的是 【 】
 A. CO_2 B. H^+ C. 缓激肽
 D. O_2 E. 乳酸
43. 时间肺活量的第 1 秒应为 【 】
 A. 63% B. 73% C. 83%
 D. 93% E. 95%
44. 男, 65 岁。间断咳喘 20 年, 曾被确诊为“慢性阻塞性肺疾病”。因喘憋加重伴双下肢水肿半年就诊。引起水肿最可能的原因是 【 】
 A. 肝硬化失代偿 B. 慢性右心衰竭 C. 下肢静脉血栓
 D. 药物不良反应 E. 营养不良
45. 男, 2 岁。玩耍中突发呼气性呼吸困难半小时急诊就诊。最可能出现的肺部体征是 【 】
 A. 肺部局限性干啰音 B. 双肺布满哨笛音 C. 双肺粗大湿啰音
 D. 胸膜摩擦音 E. 双肺底捻发音
46. 某患者持续发热($T_{38\sim 39^\circ\text{C}}$)4 小时后体温骤降至正常, 2 天后体温再度迅速上升并波动在 $38.5\sim 40^\circ\text{C}$ 数小时后迅速降至正常, 其热型是 【 】
 A. 稽留热 B. 间歇热 C. 弛张热
 D. 不规则热 E. 回归热
47. 对蛋白质消化力最强的消化液是 【 】
 A. 唾液 B. 胃液 C. 胰液
 D. 小肠液 E. 胆汁
48. 糖吸收的分子形式是 【 】
 A. 淀粉 B. 多糖 C. 寡糖
 D. 麦芽糖 E. 单糖
49. 基础代谢率的正常变化百分率应为 【 】
 A. $\pm 25\%$ B. $\pm 20\%$ C. $\pm 15\%$
 D. $\pm 30\%$ E. $\pm 5\%$
50. 触及左锁骨上窝硬而无痛的肿大淋巴结时, 首先考虑的病因是 【 】
 A. 鼻咽癌 B. 甲状腺乳头状癌 C. 原发性肝癌
 D. 贲门黏液细胞癌 E. 右侧小细胞肺癌

(51~52 题共用病例)

男,60 岁。吸烟 30 年。2 周来因刺激性干咳、气短、喜左侧卧位来诊。X 线胸片如下:



51. 最可能的诊断是 【 】
A. 左侧大叶性肺炎 B. 左侧胸腔积液 C. 右侧气胸
D. 左侧肺不张 E. 急性肺水肿
52. 上述患者病变部位最可能检出的体征是 【 】
A. 语颤消失,叩诊过清音,呼吸音减弱 B. 语颤消失,叩诊清音,呼吸音减弱
C. 语颤消失,叩诊实音,呼吸音消失 D. 语颤增强,叩诊浊音,闻及支气管呼吸音
E. 语颤消失,叩诊鼓音,呼吸音消失
53. 满月脸常见于 【 】
A. 甲状腺功能亢进症 B. 甲状腺功能减退症 C. 垂体前叶功能减退症
D. 肢端肥大症 E. 库欣综合征
54. 下列最容易引起溶血性黄疸的是 【 】
A. 败血症 B. 风湿热 C. 白血病
D. 多发性骨髓瘤 E. 异型输血
55. 大脑皮层听觉中枢的部位是 【 】
A. 额叶 B. 枕叶 C. 颞叶
D. 中央后回 E. 中央前回
56. 水冲脉的特点是 【 】
A. 脉搏骤起骤落 B. 脉搏强弱不等 C. 呼气时脉搏明显减弱
D. 脉搏迅速上升缓慢下降 E. 脉搏节律不整
57. 某患者腹壁曲张静脉分布于腹壁两侧,脐上和脐下静脉血流方向均向上。最可能的原因是 【 】
A. 肝静脉血栓 B. 胃底静脉开放 C. 脾肾静脉分流
D. 下腔静脉阻塞 E. 门静脉癌栓
58. 导致肠鸣音亢进常见的原因是 【 】
A. 机械性肠梗阻 B. 胃溃疡伴幽门梗阻 C. 服用硫酸镁后
D. 低钾低氯血症 E. 缺血性肠病
59. 可促进小肠对钙吸收的是 【 】
A. 维生素 A B. 维生素 B C. 维生素 C
D. 维生素 D₃ E. 维生素 B₁₂
60. 产生有活性的维生素 D₃ 的部位是 【 】
A. 皮肤 B. 肝脏 C. 肾脏
D. 小肠 E. 骨骼

61. 诊断急性心肌梗死最特异的指标是 【 】
 A. 肌酸激酶 B. 乳酸脱氢酶 C. 天门冬氨酸氨基转移酶
 D. 肌红蛋白 E. 肌钙蛋白
62. 确诊心房颤动最简便可靠的方法是
 A. 系统地采集病史 B. 准确的心脏听诊 C. 心电图检查
 D. 血电解质检查 E. 超声心动图检查
63. 男, 36 岁。间断性上腹痛 3 年, 近 1 周上腹胀满、反复呕吐, 呕吐后症状可缓解。查体: 振水音阳性。最可能的诊断是 【 】
 A. 胃穿孔 B. 幽门梗阻 C. 慢性胃炎
 D. 慢性胆囊炎 E. 急性胰腺炎
64. 女, 65 岁。因持续性心前区疼痛 5 小时就诊。心电图示: $V_1 \sim V_5$ 导联 ST 段呈弓背向上抬高与 T 波形成单向曲线, 异常 Q 波形成。最可能的诊断是 【 】
 A. 不稳定型心绞痛 B. 急性心肌梗死 C. 急性心肌炎
 D. 急性肺栓塞 E. 急性心包炎
65. 呼吸增快是指每分钟呼吸次数超过多少次 【 】
 A. 18 B. 20 C. 24 D. 28 E. 30
66. 正常脉压为 【 】
 A. 10~20mmHg B. 20~30mmHg C. 30~40mmHg
 D. 40~50mmHg E. 50~60mmHg
67. 瞳孔正常情况其直径约 【 】
 A. 1.5~2.5mm B. 2~2.5mm C. 2.5~3.5mm
 D. 3~4mm E. 4.5~5mm
68. 幽门梗阻的患者, 因长期呕吐常易发生的异常变化是 【 】
 A. 高钾高氯性酸中毒 B. 低钾高氯性碱中毒 C. 高钾高氯性碱中毒
 D. 高钾低氯性碱中毒 E. 低钾低氯性碱中毒
69. 休克早期, 中心静脉压和血压低的原因是 【 】
 A. 动静脉短路大量开放 B. 心力衰竭 C. 血容量不足
 D. 血容量相对过多 E. 容量血管过度收缩
70. 正确应用抗菌药物的选项是 【 】
 A. 抗菌药物的剂量一般按年龄计算 B. 应用抗菌药物后可以减免外科处理
 C. 所有的外科感染均需应用抗菌药物 D. 手术预防性用药应在术前 1 小时静脉滴入
 E. 外科感染时首选广谱抗菌药物并联合用药
71. 脾高度肿大常见于下列哪种疾病 【 】
 A. 伤寒 B. 病毒性肝炎 C. 疟疾
 D. 肝硬化 E. 慢性粒细胞性白血病
72. 肝上下界之间距离锁骨中线上 【 】
 A. 5~7cm B. 5~9cm C. 6~11cm
 D. 7~10cm E. 9~11cm
73. 下列为病理反射的是 【 】
 A. 颈强直 B. 克尼格征 C. 布鲁金斯基征
 D. 戈登征 E. 跖反射
74. 小儿头颈部烧伤所占体表面积百分比是 【 】
 A. 9% B. $[9 + (12 - \text{年龄})]\%$ C. 12%

D. $9\% \times 2$

E. $(9 + \text{年龄})\%$

75. ARDS 特征性病理变化是

- A. 肺表面活性物质的数量增加 B. 肺表面活性物质的活性增加
C. 肺内分流量减少 D. 肺血管内皮和肺泡损害, 肺间质水肿
E. 肺顺应性增强

76. 术后处理错误的是

- A. 胃肠道手术患者肛门排气后可开始进食
B. 伤口的乳胶片引流一般在术后 4~7 天拔除
C. 腹部的减张缝线一般在术后 2 周左右拆除
D. 一般性手术后的患者应鼓励早期活动
E. 一次导尿量超过 500ml 者应留置导管 1~2 天

77. 血小板计数的正常值为

- A. 10 万~20 万 B. 20 万~40 万 C. 10 万~30 万
D. 20 万~50 万 E. 10 万~50 万

78. 血清钠的正常值为

- A. 3.5~5.5mmol/L B. 4.0~5.5mmol/L C. 130~150mmol/L
D. 280~310mmol/L E. 0.75~1.25mmol/L

79. 代表心房除极的波是

- A. P 波 B. QRS 波 C. T 波 D. U 波 E. QS 波

80. 某患者误输异型血后无尿 3 天。测血压正常。最有效的治疗是

- A. 输注地塞米松 B. 输注碳酸氢钠 C. 输注甘露醇
D. 血液透析 E. 输注速尿

81. 根据烧伤早期补液的原则, 第一个 8 小时内, 应该输入第一天总液体量的

- A. 1/6 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/5 E. 1/2

82. 清创术的目的是

- A. 冲洗伤腔 B. 清除伤口内异物 C. 修剪伤口边缘
D. 清除血肿 E. 将污染伤口变为清洁伤口

83. 外科感染控制的关键是

- A. 理疗 B. 局部封闭或注药 C. 处理感染灶
D. 应用抗生素 E. 制动休息

84. 心肺复苏给药的途径首选

- A. 心内注射 B. 静脉注射 C. 气管导管内给药
D. 骨髓穿刺给药 E. 环甲膜穿刺给药

得分	评卷人	复查人

二、B 型题: 85~108 小题, 每小题 1.25 分, 共 30 分。A、B、C、D、E 是其下两道小题的备选项, 每个小题只能从中选择一个最符合题目要求的答案。每个选项可以被选择一次、两次或不被选择。

- A. 颞下颌关节 B. 肘关节 C. 膝关节
D. 桡腕关节 E. 踝关节

85. 关节囊内有交叉韧带的是

86. 关节囊内有半月板的是

- A. 输卵管 B. 子宫 C. 子宫主韧带
D. 阴道 E. 子宫颈

87. 包绕子宫颈下 1/3 部的是 【 】
88. 属子宫附件的是 【 】
- A. 球状核 B. 顶核 C. 齿状核
- D. 孤束核 E. 腹前核
89. 属于背侧丘脑的核是 【 】
90. 属于脑干内的核是 【 】
- A. 红核 B. 黑质 C. 中缝核
- D. 视上核 E. 屏状核
91. 位于视交叉上方的核团是 【 】
92. 可分泌催产素的核团是 【 】
- A. 咀嚼和吞咽 B. 紧张性收缩 C. 容受性舒张
- D. 集团蠕动 E. 分节运动
93. 消化道平滑肌共有的运动形式是 【 】
94. 起始于大肠的运动形式是 【 】
- A. 深吸气量 B. 补呼气量 C. 肺泡通气量
- D. 最大通气量 E. 时间肺活量
95. 肺的有效通气量是指 【 】
96. 能反映在肺通气机能潜力大小的指标是 【 】
- A. 腹泻伴重度失水 B. 腹泻伴发热 C. 腹泻伴明显体重减轻
- D. 腹泻伴皮疹 E. 腹泻伴关节痛或关节肿
97. 消化系肿瘤 【 】
98. 伤寒 【 】
- A. 支气管扩张 B. 肺脓肿 C. 肺癌
- D. 肺水肿 E. 肺结核
99. 女, 66 岁。因夜间喘憋、咳血性泡沫痰 1 天就诊。既往高血压病史 40 年。最可能的诊断是 【 】
100. 女, 32 岁。间断午后低热、咳嗽、咯血半年。胸片为右上肺片状渗出性病变。最可能的诊断是 【 】
- A. 600 毫升 B. 1000 毫升 C. 1500 毫升
- D. 3000 毫升 E. 5000 毫升
101. 首次胸腔穿刺放液量不超过 【 】
102. 腹腔穿刺术放液首次不得超过 【 】
- A. α 受体阻滞剂 B. β 受体阻滞剂 C. α 受体兴奋剂
- D. 强心剂 E. 胆碱能神经阻断剂
103. 酚妥拉明 【 】
104. 肾上腺素 【 】
- A. 肾母细胞瘤 B. 脂肪瘤 C. 皮脂腺囊肿
- D. 血管瘤 E. 皮肤癌
105. 来源于上皮组织的恶性肿瘤是 【 】
106. 来源于间叶组织的恶性肿瘤是 【 】
- A. 肿瘤性肿块 B. 恶性肿瘤 C. 临界肿瘤
- D. 炎性肿块 E. 良性肿瘤
107. 呈浸润性生长 【 】

108. 细胞分化程度低

得分	评卷人	复查人

三、X 型题:109~120 小题,每小题 1.25 分,共 15 分。在每个小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,至少有两项是符合题目要求的,多选或少选均不得分。

109. 含有三个生理性狭窄的器官有

- A. 喉 B. 食管 C. 输尿管
D. 输卵管 E. 男性尿道

110. 属于消化腺的是

- A. 肝 B. 脾 C. 胰
D. 舌下腺 E. 肾上腺

111. 直接汇入上腔静脉的血管有

- A. 左头臂静脉 B. 颈内静脉 C. 奇静脉
D. 锁骨下静脉 E. 右头臂静脉

112. 下列属于细胞生活的内环境的有

- A. 房水 B. 脑脊液 C. 血浆
D. 组织液 E. 体腔液

113. 能提高肌肉收缩能力的因素有

- A. Ca^{2+} B. 肾上腺素 C. 酸中毒
D. 咖啡因 E. 缺氧

114. 能使血管收缩的物质有

- A. 心房钠利尿 B. 去甲肾上腺素 C. 血管紧张素 II
D. ADH E. 内皮素

115. 符合肺部查体原则的选项包括

- A. 由前至后 B. 自下而上 C. 避开内脏
D. 双侧对比 E. 先右后左

116. 正常人的支气管呼吸音听诊部位包括

- A. 喉部 B. 第 5 颈椎 C. 胸骨上窝
D. 锁骨上窝 E. 第 2 胸椎附近

117. 下列属于腹部体表标志的选项是

- A. 腹中线 B. 腹直肌外缘 C. 髂前上棘
D. 腹股沟韧带 E. 胸骨角

118. 临床上最常用来判断营养不良的指标是

- A. 摄入量和时间 B. 近期体重改变 C. 氮平衡
D. 肌酐/身高指数 E. 血浆白蛋白值

119. 对放射性低度敏感的肿瘤有

- A. 霍奇金病 B. 多发性骨髓瘤 C. 小脑髓母细胞瘤
D. 大肠癌 E. 软组织肉瘤

120. 心肺脑复苏药物治疗的主要目的是

- A. 增加心脑血管血流,提高心肌灌注压,激发心脏跳动
B. 提高室颤阈,为电击除颤做准备 C. 预防感染
D. 纠正酸碱平衡,补充体液和电解质 E. 防治心律失常

医学综合全真模拟试卷(五)参考答案

- | | | | | | |
|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1. B | 2. E | 3. E | 4. D | 5. B | 6. B |
| 7. C | 8. C | 9. B | 10. C | 11. A | 12. E |
| 13. E | 14. D | 15. C | 16. B | 17. B | 18. D |
| 19. C | 20. A | 21. E | 22. A | 23. B | 24. B |
| 25. B | 26. B | 27. C | 28. A | 29. C | 30. C |
| 31. C | 32. E | 33. A | 34. B | 35. B | 36. C |
| 37. C | 38. D | 39. E | 40. B | 41. B | 42. C |
| 43. C | 44. B | 45. B | 46. B | 47. C | 48. E |
| 49. C | 50. D | 51. B | 52. C | 53. E | 54. E |
| 55. C | 56. A | 57. D | 58. A | 59. D | 60. C |
| 61. E | 62. C | 63. B | 64. B | 65. C | 66. C |
| 67. D | 68. E | 69. C | 70. D | 71. E | 72. E |
| 73. D | 74. B | 75. C | 76. B | 77. C | 78. C |
| 79. A | 80. D | 81. E | 82. B | 83. C | 84. B |
| 85. C | 86. C | 87. D | 88. A | 89. E | 90. D |
| 91. D | 92. D | 93. B | 94. D | 95. C | 96. D |
| 97. C | 98. D | 99. D | 100. E | 101. A | 102. C |
| 103. A | 104. C | 105. E | 106. A | 107. B | 108. B |
| 109. BCE | 110. ACD | 111. ACE | 112. BCD | 113. ABD | 114. BCDE |
| 115. CD | 116. ACE | 117. ABCD | 118. ABE | 119. DE | 120. ABDE |