

全国各类成人高等学校招生考试

专科起点升本科

医学综合全真模拟试卷(四)

(考试时间 120 分钟)

题 号	一	二	三	总 分	
题 分	105	30	15	核分人	
得 分				复查人	

得 分	评卷人	复查人

一、A 型题:1~84 小题,每小题 1.25 分,共 105 分。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

- 脑膜中动脉发自 【 】
 - 颈总动脉
 - 颈外动脉
 - 颈内动脉
 - 上颌动脉
 - 下颌动脉
- 脾动脉的分支分布范围是 【 】
 - 肝、脾、胃
 - 脾、胃、胰
 - 脾、胰和十二指肠
 - 脾、胃和十二指肠
 - 以上都不是
- 右淋巴导管 【 】
 - 由左、右腰干和肠干组成
 - 穿主动脉裂孔入胸腔
 - 收纳右半身的淋巴
 - 注入右静脉角
 - 以上都不对
- 食管的第二个狭窄距中切牙的距离大约是 【 】
 - 15cm
 - 35cm
 - 25cm
 - 40cm
 - 45cm
- 支气管镜检查时判断气管分叉的标志是 【 】
 - 右主支气管
 - 声门裂
 - 气管隆嵴
 - 前庭裂
 - 膜壁
- 分布于头面部皮肤感觉的神经是 【 】
 - 三叉神经、面神经和舌咽神经
 - 舌咽神经、舌下神经和迷走神经
 - 迷走神经、面神经和三叉神经
 - 面神经、舌下神经和三叉神经
 - 三叉神经、面神经、舌咽神经和迷走神经
- 对正中神经的叙述,错误的是 【 】
 - 发自臂丛后束
 - 支配拇收肌以外的大鱼际肌
 - 神经干损伤后拇指,食指不能屈曲
 - 损伤后可出现“猿手”
 - 损伤后屈腕力量减弱
- 鼓室内侧壁上有 【 】
 - 咽鼓管半管的开口
 - 乳突窦(鼓窦)开口
 - 鼓室盖
 - 鼓室上隐窝
 - 面神经管凸

9. 卵子受精常见的部位是 【 】
- A. 输卵管壶腹部 B. 输卵管漏斗部 C. 输卵管峡部
D. 输卵管壁内部 E. 输卵管子宫部
10. 外耳门前方可摸到搏动的动脉是 【 】
- A. 舌动脉 B. 颞浅动脉 C. 面动脉
D. 上颌动脉 E. 甲状腺上动脉
11. 共同组成躯干骨的是 【 】
- A. 胸椎、胸骨和肋骨 B. 椎骨、骶骨和尾骨
C. 椎骨、骶骨、尾骨、胸骨和 12 对肋骨 D. 椎骨、胸骨和肋骨
E. 颈椎、胸椎、腰椎、骶骨和尾骨
12. 关于黄韧带描述,正确的是 【 】
- A. 连结相邻的椎弓根之间 B. 连结相邻的椎体之间
C. 有限制脊柱过度后伸的作用 D. 连结相邻的椎弓板之间
E. 连结相邻的横突之间
13. 腹部不成对的淋巴干是 【 】
- A. 左腰干 B. 右腰干 C. 左支气管纵隔干
D. 肠干 E. 右支气管纵隔干
14. 沟通眼前房和眼后房的结构是 【 】
- A. 虹膜角膜角 B. 巩膜静脉窦 C. 泪点
D. 瞳孔 E. 前房角
15. 右主支气管的特点是 【 】
- A. 细而短 B. 细而长 C. 粗而短 D. 粗而长 E. 较倾斜
16. 输尿管 【 】
- A. 沿腰大肌外侧下降 B. 于小骨盆入口处,右侧输尿管跨越右髂总动脉前方
C. 于子宫颈外侧 2cm 处,行经子宫动脉下方
D. 于膀胱体后上方注入膀胱 E. 按行经可分为腹段和盆段
17. 属于脏胸膜的是 【 】
- A. 肺胸膜 B. 膈胸膜 C. 纵隔胸膜 D. 肋胸膜 E. 胸膜顶
18. 膀胱镜检查寻找输尿管口的标志是 【 】
- A. 输尿管 B. 膀胱三角 C. 尿道内口
D. 输尿管间襞 E. 膀胱襞
19. 精囊腺的位置是 【 】
- A. 膀胱尖后方 B. 膀胱体后方 C. 膀胱体前方
D. 膀胱底前方 E. 膀胱底后方
20. 脉管系统 【 】
- A. 由心、静脉、毛细血管和动脉组成 B. 由毛细血管、淋巴干和淋巴导管组成
C. 由静脉系和淋巴系组成 D. 由心血管系和淋巴系组成
E. 由心血管和淋巴器官组成
21. 下列选项中,属于背侧丘脑的核团是 【 】
- A. 腹后核 B. 球状核 C. 齿状核
D. 室旁核 E. 乳头体核
22. 机体内环境的稳态是指 【 】
- A. 细胞内液理化性质相对持不变 B. 细胞内液化学成分相对恒定

- C. 细胞外液理化性质相对恒定 D. 细胞内代谢水平稳定
E. 细胞外液化学成分保持恒定
23. 细胞膜去极化时, 钠离子进入细胞内的方式属于 【 】
A. 单纯扩散 B. 泵转运 C. 载体介导的易化扩散
D. 通道介导的易化扩散 E. 受体介导入胞
24. 红细胞发生叠连的主要原因是 【 】
A. 血浆球蛋白和纤维蛋白原增多 B. 红细胞数量减少
C. 血红蛋白浓度升高 D. 血浆清蛋白和纤维蛋白增多
E. 红细胞体积增大
25. 可兴奋细胞兴奋时, 共有的特征是产生 【 】
A. 收缩反应 B. 分泌 C. 神经冲动
D. 兴奋性不变 E. 电位变化
26. 血液 pH 值主要取决于哪种缓冲对 【 】
A. $\text{KHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$ B. $\text{K}_2\text{HPO}_4/\text{KH}_2\text{PO}_4$ C. $\text{NaHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$
D. $\text{Na}_2\text{HPO}_4/\text{KH}_2\text{PO}_4$ E. 蛋白质—Na 蛋白质
27. 心动周期中, 心室血流充盈主要是由于 【 】
A. 血液依赖地心引力而回流 B. 骨骼肌的挤压作用加速静脉回流
C. 心房收缩的挤压作用 D. 心室舒张的抽吸作用
E. 胸内负压促进静脉回流
28. 当颈动脉窦压力感受器传入冲动增多时, 引起的反射效应是 【 】
A. 心迷走神经紧张性减弱 B. 心交感神经紧张性加强
C. 副交感舒血管纤维紧张性减弱 D. 交感缩血管纤维紧张性减弱
E. 肽类舒血管纤维紧张性减弱
29. 呼吸过程中, 肺内压等于大气压的时期是 【 】
A. 吸气初 B. 吸气中期 C. 呼气初
D. 吸气末 E. 呼气中期
30. 外呼吸是指 【 】
A. 肺通气与肺换气 B. 机体与外界环境的气体交换
C. 肺与外环境进行气体交换 D. 肺泡与血液间进行气体交换
E. 肺泡内气体不断进行更新的过程
31. 中枢化学感受器最敏感的直接刺激物是 【 】
A. 脑脊液中的 CO_2 B. 血液中的 CO_2 C. 脑脊液中的 H^+
D. 血液中的 H^+ E. 脑脊液中 PaO_2 降低
32. 胃排空的原动力是 【 】
A. 胃运动 B. 胃内容物的体积 C. 幽门括约肌的活动
D. 食物理化性质对胃黏膜刺激 E. 胃内压与十二指肠内压差
33. 胃的容受性舒张是通过哪种途径实现的 【 】
A. 交感神经 B. 迷走神经末梢释放的乙酰胆碱
C. 迷走神经末梢释放某种肽类物 D. 壁内神经释放的生长抑素
E. 肠—胃反射
34. 安静时人体的主要产热器官是 【 】
A. 内脏 B. 脑 C. 心脏 D. 骨骼肌 E. 皮肤
35. 体温调节的基本中枢位于 【 】

- A. 延髓 B. 下丘脑 C. 脑桥 D. 小脑 E. 大脑皮层
36. 参与尿液浓缩和稀释调节中起重要作用的是 【 】
 A. 肾素 B. 血管紧张素 C. 醛固酮
 D. 抗利尿激素 E. 前列腺素
37. 对视杆细胞的叙述, 错误的是 【 】
 A. 其感色素为视紫红质 B. 具有弱光觉功能 C. 无色觉
 D. 能分辨颜色 E. 视紫红质由视蛋白和视黄醛组成
38. 最有利于体内信息传递同步化的部位是 【 】
 A. 交感神经节后纤维与平滑肌细胞之间
 B. 自主神经节前纤维与节后神经元之间
 C. 神经—骨骼肌接头处
 D. 感觉传入纤维与中枢神经元之间
 E. 缝隙连接或电突触
39. 副交感神经节后纤维末梢释放的递质是 【 】
 A. 去甲肾上腺素 B. 乙酰胆碱 C. 5-羟色胺
 D. 谷氨酸 E. 甘氨酸
40. 交感神经兴奋引起的效应是 【 】
 A. 心率加快 B. 分泌大量稀薄唾液 C. 瞳孔缩小
 D. 竖毛肌舒张 E. 支气管平滑肌收缩
41. 下列选项不属于下丘脑调节肽的是 【 】
 A. 促甲状腺激素释放激素 B. 抗利尿激素 C. 促性腺激素释放激素
 D. 生长素释放抑制激素 E. 促肾上腺皮质激素释放激素
42. 影响神经系统发育最重要的激素是 【 】
 A. 肾上腺素 B. 甲状腺激素 C. 生长素
 D. 胰岛素 E. 醛固酮
43. 可引起渗透性腹泻的疾病是 【 】
 A. 甲状腺功能亢进 B. 食物中毒 C. 口服甘露醇
 D. 脂肪吸收不良 E. 急性胰腺炎
44. 患者突发胸痛, 吸气时加重, 屏气可减轻, 提示病变累及到 【 】
 A. 胸壁皮肤 B. 肋间神经 C. 胸膜脏层
 D. 胸膜壁层 E. 肺实质
45. 昏迷伴两侧瞳孔扩大, 应考虑 【 】
 A. 巴比妥类药物中毒 B. 尿毒症 C. 有机磷中毒
 D. 中暑 E. 阿托品中毒
46. 下列哪项是引起胸痛的胸壁疾病 【 】
 A. 胸膜肿瘤 B. 胸膜炎 C. 肋间神经炎
 D. 肺肿瘤 E. 自发性气胸
47. 哪种疾病干咳而无痰 【 】
 A. 支气管炎 B. 肺结核 C. 肺癌
 D. 胸膜炎 E. 左心衰竭
48. 循环系统病最常见的咯血原因是 【 】
 A. 三尖瓣关闭不全 B. 二尖瓣狭窄 C. 主动脉瓣狭窄
 D. 肺动脉高压 E. 动脉导管未闭

49. 下列最提示颅内高压的呕吐病人为 【 】
 A. 伴眼球震颤 B. 呕吐隔宿食物 C. 呕吐呈喷射性
 D. 有外伤史 E. 早晨呕吐最剧烈
50. 属于典型分泌性腹泻的是 【 】
 A. 硫酸镁导泻 B. 小肠大部分切除后 C. 甲状腺功能亢进腹泻
 D. 霍乱腹泻 E. 肠炎
51. 心力衰竭最可能出现的体征是 【 】
 A. 奔马律 B. 第二心音分裂 C. 开瓣音
 D. 心包叩击音 E. 第一心音分裂
52. 大量心包积液最可能出现的体征是 【 】
 A. 水冲脉 B. 脱落脉 C. 交替脉 D. 无脉 E. 奇脉
53. 较少出现杵状指(趾)的疾病是 【 】
 A. 法洛四联症 B. 肺癌 C. 支气管扩张症
 D. 慢性肺脓肿 E. 缺铁性贫血
54. 关于干啰音特点的阐述,不正确的是 【 】
 A. 部位容易变换 B. 是一种持续时间较长的带乐性的呼吸附加音
 C. 音调较高 D. 部位不易变,较恒定
 E. 吸气与呼气均可听及,但以呼气时明显
55. 大叶性肺炎实变期患侧可出现 【 】
 A. 胸廓饱满,呼吸运动减弱 B. 语颤增强,管状呼吸音
 C. 局限性干啰音 D. 肺泡呼吸音增强 E. 气管偏向健侧
56. 心前区隆起可见于下列哪种疾病 【 】
 A. 肺心病 B. 冠心病 C. 高心病
 D. 儿童时患先心病 E. 甲状腺功能亢进性心脏病
57. 女,25岁。急躁易怒、食欲亢进、排稀便(3~4次/日)、消瘦3个月就诊。查体:皮肤潮湿,双肺呼吸音清,心率108次/分,律齐,心音有力,腹部查体无异常,双手震颤。最可能的诊断是 【 】
 A. 2型糖尿病 B. 结肠癌 C. 甲状腺功能减退症
 D. 甲状腺功能亢进症 E. 肠易激综合征
58. 移动性浊音阳性表明腹腔内游离液体量至少达到 【 】
 A. 100ml B. 300ml C. 500ml D. 3000ml E. 1000ml
59. 周围血管征产生的机理是 【 】
 A. 脉压增大 B. 血压降低 C. 脉压减小
 D. 舒张压升高 E. 收缩压升高、舒张压升高
60. 一年轻患者高血压,在脐周围及其左右上方听到强弱不等的粗糙的吹风样杂音,首先考虑的诊断是 【 】
 A. 肾动脉狭窄 B. 主动脉腹部狭窄 C. 包块压迫肾动脉
 D. 肝硬化 E. 门静脉高压
61. 男,74岁。剑突下不适、反酸10天,间断排黑色成形便2次。20天前接受冠状动脉支架术后行抗血小板治疗。导致上述症状最可能的原因是 【 】
 A. 胃癌 B. 急性糜烂出血性胃炎 C. 反流性食管炎
 D. 十二指肠溃疡 E. 食管癌
62. 女,28岁。上腹痛3天,发热1天就诊。查体:右下腹压痛及反跳痛阳性。血 WBC $15 \times 10^9/L$

- 10⁹/L, N 0.88, Plt 300×10⁹/L。最可能的诊断是 【 】
- A. 宫外孕 B. 肠结核 C. 尿路感染
D. 胃穿孔 E. 急性阑尾炎
63. 属深反射的是 【 】
- A. 角膜反射 B. 腹壁反射 C. 桡骨骨膜反射
D. 提睾反射 E. 瞳孔对光反射
64. 以下哪项表示 QRS 波正向和负向波振幅相等 【 】
- A. Qr B. QR C. Rs D. rSr' E. qRs
65. II 度房室传导阻滞的最大特征是 【 】
- A. P-R 间期逐渐延长 B. 部分 P 波后无 QRS 波群
C. QRS 波外形正常 D. R-R 间期相等 E. 房室分离
66. P-R 间期正常值为 【 】
- A. 0.10~0.16s B. 0.11~0.17s C. 0.12~0.18s
D. 0.11~0.19s E. 0.11~0.20s
67. 高血压患者, 心电图表现为 P 波时间 0.10 秒, 电轴 -20 度, R_I 电压 1.7mV, R_{aVL} 1.8mV, R_I + S_{III} 3.0mV, V₅ ST 段下移 0.07mV, V₅₋₆ T 波倒置, 心电图诊断 【 】
- A. 左室肥大 B. 右室肥大 C. 双室肥大
D. 冠状动脉供血不足 E. 心包积液
68. 下列哪项不是高渗性脱水的诊断依据 【 】
- A. 口渴 B. 皮肤弹性差, 眼窝深陷
C. 尿量减少, 尿比重大于 1.03 D. 血清钠大于 150mmol/L
E. 心电图显示 T 波高尖, QT 间期延长, QRS 波群增宽, PR 间期延长
69. 估计术后患者体液平衡的使用方法是 【 】
- A. 身体水分估计 B. 血压 C. 心率
D. 每日患者体重变化 E. 尿量
70. 正常人血中 HCO₃⁻ 与 H₂CO₃ 之比是 【 】
- A. 10:1 B. 15:1 C. 25:1 D. 20:1 E. 30:1
71. 关于输血的适应证, 错误的是 【 】
- A. 大出血时补充血容量 B. 纠正贫血或低蛋白血症 C. 凝血异常补充各种凝血因子
D. 增加营养和供应能量 E. 严重感染时输入补体、抗体
72. 各型休克的共同特点是 【 】
- A. 血压下降 B. 皮肤苍白 C. 有效循环血量的急剧减少
D. 四肢湿冷 E. 烦躁不安
73. 诊断败血症主要依据 【 】
- A. 有局部感染灶 B. 寒战高热 C. 血菌培养(+)
D. 皮肤粘膜出血点 E. 白细胞增高
74. 减少免疫反应所致输血引起的发热反应采用 【 】
- A. 严格清洗, 消毒采血和输血用具 B. 选用洗涤红细胞
C. 选用一次性输血器 D. 采用无热原技术酸制保存液
E. 减慢输血速度
75. 多系统或(和)器官衰竭最常见的是 【 】
- A. 胃肠、心、肺 B. 脑、肺、血液 C. 心、肺、肾
D. 肝、肾、胃肠 E. 血液、心、胃肠

76. 有关急性化脓性腱鞘炎的叙述,不正确的是 【 】

- A. 患指中、近节均匀性肿胀
- B. 患指皮肤极度紧张
- C. 患指做被动伸指运动时疼痛加剧
- D. 炎症一般不会蔓延到手掌间隙
- E. 不及时切开减压肌腱可发生缺血

77. 有关术后发热的描述,正确的是 【 】

- A. 非感染性发热通常比感染性发热来得早
- B. 约 90% 的患者体温超过 37℃
- C. 约 50% 患者体温超过 38℃
- D. 术后发热一定表示并发感染
- E. 发热不是最常见的症状

78. 对污染较重的伤口清洗后,暂不予缝合,观察 2~3 天后如无明显感染,再行缝合,这种缝合称为 【 】

- A. 一期缝合
- B. 二期缝合
- C. 延期缝合
- D. 减张缝合
- E. 以上都不是

79. 不影响创伤后修复过程的因素是 【 】

- A. 感染
- B. 高血压
- C. 糖皮质激素
- D. 低蛋白血症
- E. 糖尿病

80. 以下哪个是恶性肿瘤的特征 【 】

- A. 呈膨胀性生长
- B. 包膜不完整
- C. 细胞分化程度高
- D. 症状进展慢
- E. 不发生转移

81. 下列选项与烧伤休克期无关的是 【 】

- A. 口渴、烦躁
- B. 手足湿冷
- C. 尿少并可有血红蛋白尿
- D. 心率增快
- E. 高热、谵妄

82. 关于术前胃肠道准备,下列选项错误的是 【 】

- A. 胃肠道手术病人,术前 1~2 天开始进流质饮食
- B. 术前 2 小时开始禁食,2 小时开始禁水
- C. 一般性手术术前天做肥皂水灌肠
- D. 结肠或直肠手术应清洁灌肠及口服肠道抑菌药物
- E. 必要时可做胃肠减压

83. 关于术后病人早期活动的优点,下列说法不恰当的是 【 】

- A. 增加肺活量,减少肺部并发症
- B. 减少下肢静脉瘀血及血栓
- C. 有利于肠道功能,减少腹胀
- D. 有利于减少切口感染
- E. 有利于膀胱功能的恢复,减少尿潴留

84. 小儿头颈部烧伤应占体表面积的百分数是 【 】

- A. 9%
- B. 12%
- C. $9\% \times 2$
- D. $[9 + (12 - \text{年龄})]\%$
- E. $9\% + \text{年龄}$

得分	评卷人	复查人

二、B 型题:85~108 小题,每小题 1.25 分,共 30 分。A、B、C、D、E 是其下两道小题的备选项,每个小题只能从中选择一个最符合题目要求的答案。每个选项可以被选择一次,两次或不被选择。

- A. 菌状乳头
- B. 丝状乳头
- C. 舌下阜
- D. 舌下襞
- E. 舌盲孔

85. 能感受味觉的结构是 【 】

86. 下颌下腺开口于 【 】

- A. 听
- B. 第 I 躯体感觉区
- C. 第 I 躯体运动区

- D. 运动性语言中枢 E. 视区
87. 位于距状沟两侧皮质的是 【 】
88. 位于颞横回的是 【 】
- A. 三叉神经运动核 B. 疑核 C. 副神经核
- D. 面神经核 E. 动眼神经副核
89. 支配咀嚼肌的核团是 【 】
90. 属副交感核的是 【 】
- A. Na^+ 内流 B. Cl^- 内流 C. Ca^{2+} 内流
- D. K^+ 内流 E. K^+ 外流
91. 静息电位形成的主要原因是 【 】
92. 骨骼肌细胞动作电位升支形成的原因是 【 】
- A. 血浆胶体渗透压降低 B. 组织液胶体渗透压升高 C. 毛细血管血压升高
- D. 组织液静水压升高 E. 淋巴回流受阻
93. 右心衰竭时组织水肿的主要原因是 【 】
94. 肾脏疾病时组织水肿的主要原因是 【 】
- A. 盐皮质激素 B. 生长激素 C. 甲状旁腺激素
- D. 肾上腺素 E. 甲状腺激素
95. 对基础代谢率有明显影响的激素是 【 】
96. 升高血钙、降低血磷的激素是 【 】
- A. 感染性腹泻 B. 小肠吸收不良 C. 渗透性腹泻
- D. 分泌性腹泻 E. 肠道运动异常
97. 甲状腺功能亢进表现的症状是 【 】
98. 口服甘露醇表现的症状是 【 】
- A. 瞳孔扩大呈椭圆形 B. 瞳孔形状不规则 C. 瞳孔缩小
- D. 两侧瞳孔大小不等 E. 两侧瞳孔增大
99. 青光眼 【 】
100. 颅内病变 【 】
- A. 晶状体 B. 睫状体 C. 玻璃体 D. 角膜 E. 虹膜
101. 房水产生的部位是 【 】
102. 无色透明富含神经但无血管的部位是 【 】
- A. 肩胛线第 7~8 肋间 B. 腰椎棘突突出的部位
- C. 脐与左髂前上棘连线中外 1/3 交点处
- D. 第 3~4 腰椎棘突间隙 E. 髂前上棘后 1~2cm 处
103. 常用的骨髓穿刺部位是 【 】
104. 常用的腰椎穿刺部位是 【 】
- A. 雌激素的作用 B. 雌激素与生长素的作用 C. 孕激素与生长素的作用
- D. 催乳素与催产素的作用 E. 雌激素、孕激素与催乳素的作用
105. 青春期乳腺发育主要是由于 【 】
106. 妊娠期乳腺发育主要是由于 【 】
- A. 清洁伤口 B. 沾染伤口 C. 感染伤口
- D. 二期愈合 E. 一期愈合
107. 延迟处理的开放性伤口属于 【 】
108. 沾染伤口清创后,愈合达到 【 】

得分	评卷人	复查人

三、X 型题:109~120 小题,每小题 1.25 分,共 15 分。在每个小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,至少有两项是符合题目要求的,多选或少选均不得分。

109. 能屈肘关节的肌是 【 】
 A. 肱肌 B. 喙肱肌 C. 肱桡肌
 D. 肱二头肌 E. 肱三头肌
110. 属于男性生殖附属腺的结构有 【 】
 A. 精囊腺 B. 前列腺 C. 尿道球腺
 D. 附睾 E. 输精管
111. 上腔静脉的直接属支有 【 】
 A. 左头臂静脉 B. 右头臂静脉 C. 头静脉
 D. 左颈内静脉 E. 右锁骨下静脉
112. 与骨骼肌相比,心肌的特点是 【 】
 A. 肌浆网相对不发达 B. 对细胞外 Ca^{2+} 依赖性大
 C. 呈“全或无”式收缩 D. 不发生完全强直收缩 E. 有效不应期长
113. 能产生快反应动作电位的心脏细胞有 【 】
 A. 心房肌细胞 B. 心室肌细胞 C. 窦房结细胞
 D. 房室结细胞 E. 浦肯野细胞
114. 小肠分节运动的作用有 【 】
 A. 促进吸收 B. 使食糜与消化液充分混合
 C. 有助于血液及淋巴回流 D. 延长食糜在肠内停留时间
 E. 使食糜较快地向上方推进
115. 下列描述中,正确的包括 【 】
 A. 化脓性胸膜炎咳脓性痰 B. 肺水肿时咳粉红色泡沫痰
 C. 支气管扩张多为无痰干咳 D. 自发性气胸时可引起咳嗽
 E. 左心功能不全多为干咳
116. 下列表现中,支持呼气性呼吸困难的是 【 】
 A. 呼气时间延长 B. 小气管狭窄 C. 有“三凹征”
 D. 常伴呼气性哮鸣音 E. 常见于支气管哮喘
117. 问诊现病史的主要内容包括 【 】
 A. 起病情况及时间 B. 病因或诱因 C. 主要症状的特点
 D. 伴随症状 E. 病情演变及诊治经过
118. 下述哪些是二尖瓣狭窄患者的体征 【 】
 A. 心尖冲动可向左移 B. 心尖部舒张期震颤 C. 心浊音界呈梨形
 D. 第一心音亢进 E. 心尖部闻及隆隆样舒张期杂音
119. 常用的血液成分制品包括 【 】
 A. 红细胞制品 B. 冷沉淀 C. 血小板制剂
 D. 新鲜冰冻血浆 E. 右旋糖酐
120. 黑痣发生恶变的主要表现有 【 】
 A. 迅速增大 B. 色素突然增加 C. 局部淋巴结肿大
 D. 黑头破溃溢出豆渣样物 E. 局部疼痛出血

医学综合全真模拟试卷(四)参考答案

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. B | 3. D | 4. C | 5. C | 6. E |
| 7. A | 8. E | 9. A | 10. B | 11. C | 12. D |
| 13. D | 14. D | 15. C | 16. C | 17. A | 18. D |
| 19. E | 20. D | 21. A | 22. C | 23. D | 24. A |
| 25. E | 26. C | 27. D | 28. D | 29. D | 30. A |
| 31. C | 32. A | 33. C | 34. A | 35. B | 36. D |
| 37. D | 38. E | 39. B | 40. A | 41. B | 42. B |
| 43. C | 44. D | 45. E | 46. C | 47. D | 48. B |
| 49. C | 50. D | 51. A | 52. E | 53. E | 54. D |
| 55. B | 56. D | 57. D | 58. E | 59. A | 60. A |
| 61. B | 62. E | 63. C | 64. B | 65. B | 66. E |
| 67. A | 68. E | 69. D | 70. D | 71. D | 72. C |
| 73. C | 74. B | 75. C | 76. D | 77. A | 78. C |
| 79. B | 80. B | 81. E | 82. B | 83. D | 84. D |

- | | | | | | |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 85. A | 86. C | 87. E | 88. A | 89. A | 90. E |
| 91. E | 92. A | 93. C | 94. A | 95. E | 96. C |
| 97. E | 98. C | 99. A | 100. D | 101. B | 102. D |
| 103. E | 104. D | 105. A | 106. E | 107. C | 108. E |
| 109. ACD | 110. ABC | 111. AB | 112. ABCDE | 113. ABE | 114. ABCD |
| 115. BD | 116. ABDE | 117. ABCDE | 118. ABCDE | 119. ABCD | 120. ABE |