

全国各类成人高等学校招生考试

专科起点升本科

医学综合全真模拟试卷(三)

(考试时间 120 分钟)

题 号	一	二	三	总 分	
题 分	105	30	15	核分人	
得 分				复查人	

得 分	评卷人	复查人	一、A 型题:1~84 小题,每小题 1.25 分,共 105 分。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

- 颈椎的特征性结构是 【 】
 - 横突肋凹
 - 横突
 - 棘突较长
 - 横突孔
 - 上、下关节突
- 防止胫骨前、后移位的韧带是 【 】
 - 胫侧副韧带
 - 腓侧副韧带
 - 髌韧带
 - 前、后交叉韧带
 - 腓斜韧带
- 通过膈食管裂孔的结构是 【 】
 - 膈神经
 - 胸导管
 - 内脏大神经
 - 迷走神
 - 内脏小神经
- 能震动内耳外淋巴的是 【 】
 - 砧骨
 - 蹬骨
 - 锤骨
 - 腭帆张肌
 - 蹬骨肌
- “猿手”是损伤了 【 】
 - 尺神经
 - 桡神经
 - 正中神经
 - 腋神经
 - 肌皮神经
- 位于肾门处的结构是 【 】
 - 肾
 - 肾大盏
 - 肾小盏
 - 肾柱
 - 输尿管
- 由四层腹膜构成的结构是 【 】
 - 小网膜
 - 小肠系膜
 - 大网膜
 - 阑尾系膜
 - 乙状结肠系膜
- 脊髓 【 】
 - 位于椎管内
 - 与 32 对脊神经相连
 - 有 33 个节段
 - 腰髓有侧角
 - 下端为马尾
- 听觉中枢位于 【 】

- A. 中央前回 B. 中央后回 C. 颞横回
D. 距状沟两侧的皮质 E. 海马旁回
10. 属间脑的结构是 【 】
A. 延髓 B. 中脑 C. 脑桥
D. 下丘脑 E. 端脑
11. 下列属于腹主动脉发出的成对的脏支是 【 】
A. 卵巢动脉 B. 脾动脉 C. 膈下动脉
D. 膈上动脉 E. 腹腔干
12. 下列属于肝门静脉属支的是 【 】
A. 肾静脉 B. 肝静脉 C. 卵巢静脉
D. 肠系膜下静脉 E. 膀胱静脉
13. 肱三头肌的主要作用是 【 】
A. 屈肘关节 B. 屈肩关节 C. 伸肘关节
D. 外展肩关节 E. 内展肩关节
14. 关于胃的叙述, 正确的是 【 】
A. 胃充盈时, 胃大弯向右下方移动
B. 胃底是指贲门切迹平面以上胃的部分
C. 幽门部的右侧部分称幽门窦
D. 胃肌和胃粘膜在幽门形成环形皱襞称幽门瓣
E. 幽门管通常居胃的最底部
15. 空气进入中耳鼓室要通过的结构是 【 】
A. 外耳道 B. 内耳道 C. 乳突小房
D. 鼻泪管 E. 咽鼓管
16. 胃溃疡的好发部位是 【 】
A. 幽门部 B. 胃体前壁 C. 胃大弯
D. 贲门部 E. 胃底
17. 男性的生殖腺是 【 】
A. 睾丸 B. 前列腺 C. 尿道球腺
D. 精囊腺 E. 附睾
18. 对子宫韧带作用的描述, 错误的是 【 】
A. 子宫阔韧带限制子宫向两侧移位 B. 子宫圆韧带防止子宫下垂
C. 骶子宫韧带维持子宫前屈 D. 子宫主韧带防止子宫下垂
E. 子宫圆韧带维持子宫的前倾
19. 心肌正常收缩的起搏点是 【 】
A. 窦房结 B. 房室结 C. 房室束
D. 房室交点 E. 颈动脉窦
20. 全身最粗大的脊神经是 【 】
A. 正中神经 B. 尺神经 C. 坐骨神经
D. 胫神经 E. 股神经
21. 损伤后可导致不能伸小腿、膝反射消失的神经是 【 】
A. 坐骨神经 B. 胫神经 C. 闭孔神经
D. 股神经 E. 腓总神经
22. 一般脂溶性物质进出细胞膜是通过 【 】

- A. 主动转运 B. 易化扩散 C. 出胞作用
D. 入胞作用 E. 单纯扩散
23. 使中心静脉压升高的因素是 【 】
A. 血容量增加 B. 静脉回心血量减少 C. 周围血管舒张
D. 循环血量减少 E. 心脏射血能力增强
24. 当跨膜电位的数值向膜内负值加大的方向变化时称为膜的 【 】
A. 去极化 B. 极化 C. 反极化
D. 超极化 E. 复极化
25. 血管外破坏红细胞的主要场所是 【 】
A. 肾脏和肝脏 B. 脾脏和肝脏 C. 胸腺和骨髓
D. 肺脏 E. 淋巴结
26. 心动周期中,心室内压大幅度升高的时期被称为 【 】
A. 等容舒张期 B. 等容收缩期 C. 减慢射血期
D. 快速充盈期 E. 心房收缩期
27. 生理情况下影响收缩压的主要变量是 【 】
A. 心率 B. 外周阻力 C. 搏出量
D. 血管容量 E. 动脉壁弹性
28. 肺通气所遇到的弹性阻力来自 【 】
A. 胸廓 B. 气道 C. 肺的弹性纤维
D. 肺组织和胸廓 E. 肺泡表面张力
29. 肺活量等于 【 】
A. 补吸气量+补呼气量 B. 功能余气量-余气量 C. 肺总容量-余气量
D. 补吸气量+潮气量 E. 补呼气量+潮气量
30. 氧解离曲线右移的原因是 【 】
A. 血液二氧化碳分压降低 B. 组织温度降低 C. 血红蛋白含量升高
D. 红细胞内 2,3-二磷酸甘油酸浓度降低 E. 血液 pH 降低
31. 消化道集团蠕动发生的部位是 【 】
A. 大肠 B. 胃底和胃体 C. 十二指肠
D. 空肠和回肠 E. 食管
32. 胆汁的生理作用不包括 【 】
A. 中和一部分胃酸 B. 乳化脂肪 C. 促进蛋白质的吸收
D. 促进脂肪酸的吸收 E. 促进维生素 A、D、E、K 的吸收
33. 糖原贮存最多的组织或器官是 【 】
A. 肝脏 B. 脑 C. 肌肉
D. 脂肪组织 E. 血液
34. 体温调节的基本中枢位于 【 】
A. 下丘脑 B. 中脑 C. 脑桥
D. 延髓 E. 脊髓
35. 大量饮清水后尿量增多的原因主要是 【 】
A. 血浆晶体渗透压降低 B. 血浆胶体渗透压降低 C. 肾小球滤过率增加
D. 发生了定比重吸收 E. 肾小管液晶体渗透压降低
36. 与葡萄糖重吸收密切相关的离子转运过程是 【 】
A. 钙离子主动重吸收 B. 钠离子主动重吸收 C. 钾离子主动重吸收

- D. 氯离子被动重吸收 E. 氢离子被动重吸收
37. 眼在视近物时发生的调节过程是 【 】
 A. 瞳孔散大 B. 视轴倾斜 C. 玻璃体向上下凸
 D. 晶状体向前后凸 E. 视野变宽
38. 视杆细胞的特点是 【 】
 A. 光敏感度高 B. 对物体的分辨力强 C. 能分辨颜色
 D. 分布于视网膜中央 E. 与色盲的发生有关
39. 动眼神经分布的范围包括 【 】
 A. 上直肌 B. 上斜肌 C. 下直肌
 D. 下斜肌 E. 内直肌
40. 某人的红细胞与 B 型血的血清发生凝集,其血清与 B 型血的红细胞也发生凝集,此人血型是 【 】
 A. B 型 B. O 型 C. AB 型
 D. A 型 E. Rh 血型
41. 室旁核主要分泌 【 】
 A. 催产素 B. 催乳素 C. 生长素
 D. 抗利尿激素 E. 促肾上腺皮质激素释放激素
42. 对蛋白质消化力最强的消化液是 【 】
 A. 胆汁 B. 胰液 C. 胃液
 D. 小肠液 E. 唾液
43. 男,38 岁。招工查体的实验室检查不正常的指标是 【 】
 A. 白细胞计数 $5 \times 10^9/L$ B. 血红蛋白 $104g/L$ C. 中性粒细胞百分比 62%
 D. 血小板计数 $220 \times 10^9/L$ E. 红细胞沉降率 $14mm/h$
44. 胆囊炎的疼痛可牵涉到 【 】
 A. 上腹部及脐周 B. 右胸右肩 C. 左胸左肩
 D. 胸骨后 E. 下胸部
45. 纵隔肿瘤、支气管肺癌引起的咳嗽特点是 【 】
 A. 咳嗽伴声音嘶哑 B. 犬吠样咳嗽 C. 金属音咳嗽
 D. 咳嗽声音低微 E. 以上都不是
46. 正常成人体格检查时不会出现叩诊音是 【 】
 A. 清音 B. 浊音 C. 过清音
 D. 实音 E. 鼓音
47. 关于体位的叙述,不正确的是 【 】
 A. 身体活动自如,不受限制为主体位
 B. 自主体位可见于轻症和疾病早期
 C. 被动体位可见于意识丧失者
 D. 为减轻痛苦,被迫采取某种特殊体位为被动体位
 E. 辗转体位为强迫体位
48. 血尿最常见的原因是 【 】
 A. 泌尿系统炎症 B. 急性阑尾炎 C. 急性盆腔炎
 D. 流行性出血热 E. 血小板减少性紫癜
49. 男,21 岁。车祸头部外伤后,并发脑疝。双侧瞳孔最可能的改变是 【 】
 A. 大小不等 B. 如针尖大小 C. 不规则

- D. 散大 E. 直径 3~4mm
50. 心脏检查时不会触及震颤的疾病是 【 】
 A. 二尖瓣狭窄 B. 主动脉瓣狭窄 C. 室间隔缺损
 D. 主动脉瓣关闭不全 E. 动脉导管未闭
51. 伤寒病的特征性表现是 【 】
 A. 荨麻疹 B. 玫瑰疹 C. 斑丘疹
 D. 淤点 E. 斑疹
52. 蜘蛛痣及肝掌产生的机理是 【 】
 A. 脾功能亢进 B. 毛细血管脆性增加 C. 血小板减少
 D. 肝脏对雌激素灭活能力减弱 E. 小动脉炎症
53. 关于颈静脉, 错误的是 【 】
 A. 立位颈外静脉常不显露 B. 坐位时可稍显露
 C. 平卧时充盈的水平仅限于锁骨上缘至下颌角距离的下 1/3 处
 D. 卧位时如充盈度超过正常水平, 或立位与坐位时可见明显静脉充盈, 称为颈静脉怒张
 E. 颈静脉怒张可见于上腔静脉综合征
54. 甲状腺功能减退症典型的面容是 【 】
 A. 面具面容 B. 满月面容 C. 苦笑面容
 D. 贫血面容 E. 黏液性水肿面容
55. 蜘蛛痣不常出现的部位是 【 】
 A. 腹部 B. 上臂及手背 C. 肩颈部
 D. 前胸部 E. 颜面部
56. 关于腋窝淋巴结检查, 不正确的描述是 【 】
 A. 检查者用示指、中指、环指触摸双侧淋巴结
 B. 检查前协助受检者前臂稍外展
 C. 腋窝淋巴结分为五群, 均应触摸
 D. 检查者用右手触摸受检者右侧淋巴结 E. 应按顺序滑行触诊
57. 隆隆样杂音常用于形容哪一种疾病杂音的性质 【 】
 A. 二尖瓣狭窄 B. 主动脉瓣关闭不全 C. 房间隔缺损
 D. 室间隔缺损 E. 动脉导管未闭
58. 二尖瓣听诊区收缩期杂音的产生机理是局部存在 【 】
 A. 血流加速 B. 瓣膜口狭窄 C. 瓣膜口关闭不全
 D. 异常通道 E. 心腔内漂浮物
59. 容易引发振水音的病症是 【 】
 A. 肝硬化腹腔积液 B. 幽门梗阻 C. 急性肠梗阻
 D. 急性腹膜炎 E. 大量心包积液
60. 典型急性左心衰竭痰液的性状是 【 】
 A. 铁锈色痰 B. 黄绿色痰 C. 黄色脓痰
 D. 粉红色泡沫痰 E. 恶臭痰
61. 肠鸣音减弱或消失见于 【 】
 A. 急性肠炎 B. 麻痹性肠梗阻 C. 消化道出血
 D. 服泻药后 E. 机械性肠梗阻
62. 关于肝界的描述, 错误的是 【 】
 A. 膈中线其上界 7 肋间 B. 锁骨中线其上界 5 肋间

- C. 肩胛线其上界 8 肋间 D. 腋中线其下界 10 肋骨水平
E. 肩胛线其下界 10 肋骨水平
63. 男, 26 岁。自幼年起反复发作性喘憋, 氨茶碱治疗有效。近 3 天上述症状再次出现。查体: 双肺布满呼气相哮鸣音。该患者最可能的诊断是 【 】
A. 慢性阻塞性肺疾病 B. 肺炎链球菌肺炎 C. 气胸
D. 支气管哮喘 E. 支气管扩张症
64. 胸腔积液中腺苷脱氨酶(ADA)明显升高常见于 【 】
A. 病毒感染 B. 血胸 C. 全心衰竭
D. 肺癌胸膜转移 E. 结核性胸膜炎
65. 患者风湿性心脏病二尖瓣狭窄, 心电图表现为 P 波 0.11 秒, I、II、aVL 导联 P 波双峰状, 峰间距 0.04 秒, V_1 P 波呈负正双向波, 负向部 0.04 秒, 深度 -1.0mV, 心电图诊断是 【 】
A. 右房肥大 B. 左房肥大 C. 双房肥大
D. 右室肥大 E. 正常
66. 骨髓穿刺术是采取骨髓液的一种常用诊断手术, 其检查内容主要包括 【 】
A. 细胞学、原虫和细菌学 B. 细胞学、原虫和白血病
C. 细胞学、细菌学和脊髓炎 D. 细胞学、细菌学和脑瘤
E. 细胞学、细菌学和脑血管病变
67. 下列哪项可引起低渗性缺水 【 】
A. 急性肠梗阻 B. 利用排钠利尿剂 C. 大量出汗
D. 弥漫性腹膜炎 E. 尿崩症
68. 通常情况下, 静脉补充钾盐时, 每 500ml 液体中含钾不宜超过 【 】
A. 0.5g B. 1g C. 2g
D. 1.5g E. 2.5g
69. 男, 40 岁。呕吐胃内容物 1 月余, 血 pH7.5, 血钾 3.0mmol/L, 尿呈弱酸性。初步诊断为 【 】
A. 呼吸性酸中毒 B. 呼吸性碱中毒 C. 代谢性酸中毒
D. 低钾性碱中毒 E. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
70. 休克失代偿期的微循环变化主要是 【 】
A. 微循环收缩期 B. 微循环扩张期 C. 微循环衰竭期
D. 直接通道开放 E. 动静脉短路开放
71. 高排低阻型休克最常见于 【 】
A. 低血容量休克 B. 感染性休克 C. 心源性休克
D. 神经源性休克 E. 过敏性休克
72. 破伤风病人的治疗原则是 【 】
A. 预防和抢救休克 B. 早期行气管切开
C. 清除毒素来源, 中和毒素, 控制和解除痉挛
D. 高压氧治疗 E. 应用破伤风类毒素
73. 有关烧伤程度的基本估计, 正确的是 【 】
A. 轻度烧伤, II 度烧伤面积 5% 以下 B. 中度烧伤, III 度烧伤面积 10%~20%
C. 中度烧伤, II 度烧伤面积 11%~30% D. 重度烧伤, III 度烧伤面积 30%~40%
E. 特重烧伤, 烧伤总面积 80% 以上
74. 术后肺不张的主要预防和治疗方法是 【 】

- A. 应用广谱抗生素 B. 应用糖皮质激素 C. 应用祛痰药
D. 及时吸氧 E. 鼓励咳嗽和深呼吸
75. 心肺复苏首选的药物是 【 】
A. 阿托品 B. 去甲肾上腺素 C. 肾上腺素
D. 碳酸氢钠 E. 异丙肾上腺素
76. 输血的早期并发症中,最严重的是 【 】
A. 发热反应 B. 过敏反应 C. 溶血反应
D. 细菌污染反应 E. 出血倾向
77. 诊断急性肾衰,最重要的实验室检查是 【 】
A. 血清钾 B. 血清钠 C. 血肌酐
D. 红细胞比积 E. CO_2CP
78. 女,30岁。因甲状腺腺瘤而手术,术后5天拆线时切口已愈合,但颈前皮下有积液。其切口愈合类型应记为 【 】
A. I/甲 B. I/丙 C. I/乙
D. II/甲 E. II/乙
79. 复苏后治疗中,保证一切措施奏效的先决条件是 【 】
A. 应用糖皮质激素 B. 防治肾衰竭 C. 循环功能的稳定
D. 脑复苏 E. 预防感染
80. 恶性肿瘤具有的重要特征是 【 】
A. 肿块质地硬 B. 病史短 C. 浸润性生长
D. 区域淋巴结肿大 E. 肿块巨大
81. 心肺复苏后,关键性处理是 【 】
A. 密切监测病情变化 B. 维持良好的通气 C. 控制感染
D. 脑复苏 E. 维持适度的血压
82. 溶血性链球菌感染的特点中,错误的是 【 】
A. 易扩散,缺乏局限化倾向 B. 脓液稀薄 C. 易导致败血症
D. 是蜂窝织炎常见致病菌 E. 常有转移性脓肿
83. 挤压颜面部“危险三角区”的疖肿容易并发 【 】
A. 颅内海绵状静脉窦炎 B. 上矢状静脉窦炎 C. 化脓性脑膜炎
D. 蝶窦炎 E. 脑脓肿
84. 胸外心脏挤压时,应使胸骨下陷 【 】
A. 2~3cm B. 3~4cm C. 4~5cm
D. 5~6cm E. >6cm

得分	评卷人	复查人

二、B型题:85~108小题,每小题1.25分,共30分。A、B、C、D、E是其下两道小题的备选项,每个小题只能从中选择一个最符合题目要求的答案。每个选项可以被选择一次、两次或不被选择。

- A. 腮腺 B. 前庭大腺 C. 下颌下腺
D. 舌下腺 E. 甲状腺
85. 位于舌下襞深面的是 【 】
86. 位于下颌骨体内面的是 【 】
A. 十二指肠球部 B. 十二指肠降部 C. 十二指肠水平部
D. 十二指肠升部 E. 十二指肠空肠曲

87. 胆总管和胰管共同开口部位是 【 】
88. 十二指肠溃疡好发部位是 【 】
- A. 眼神经 B. 舌下神经 C. 下颌神经
- D. 上颌神经 E. 面神经
89. 穿颅底圆孔的神经是 【 】
90. 穿颅底卵圆孔的神经是 【 】
- A. 绝对不应期 B. 相对不应期 C. 超常期
- D. 低常期 E. 静息期
91. 兴奋性为零的时相是 【 】
92. 阈值最低的时相是 【 】
- A. 菊粉 B. 葡萄糖 C. 抗利尿激素
- D. 甘露醇 E. 碘锐特
93. 可用于准确可靠地测定肾小球滤过率的物质是 【 】
94. 推测肾血浆流量可选择静脉注射的物质是 【 】
- A. Na^+ B. 水 C. HCO_3^-
- D. H^+ E. 葡萄糖
95. 正常情况下, 近曲小管能够全部重吸收的是 【 】
96. 65%~70%被近曲小管重吸收的是 【 】
- A. 胸骨右缘第2肋间收缩期喷射性杂音 B. 胸骨左缘第2肋间连续性杂音
- C. 心尖区舒张期隆隆样杂音 D. 胸骨左缘第3肋间舒张期叹气样杂音
- E. 心尖区收缩期吹风样杂音
97. 二尖瓣狭窄杂音的特点是 【 】
98. 主动脉瓣狭窄杂音的特点是 【 】
- A. 主动脉瓣关闭不全 B. 二尖瓣关闭不全 C. 二尖瓣狭窄
- D. 高血压 E. 完全性房室传导阻滞
99. 第一心音亢进的症状是 【 】
100. 第一心音减弱的症状是 【 】
- A. PaCO_2 B. PaO_2 C. pH
- D. BE E. SaO_2
101. 表示机体氢离子浓度的指标是 【 】
102. 主要用于判断有机体代谢性酸碱失衡的指标是 【 】
- A. 口服为主 B. 管饲为主 C. 胃肠外营养
- D. 要素饮食 E. 口服加胃肠外补充电解质
103. 昏迷病人或不愿进食的病人 【 】
104. 严重烧伤和严重的感染 【 】
- A. 6~7日 B. 4~5日 C. 8~9日
- D. 13~14日 E. 10~12日
105. 下肢手术后拆线时间是 【 】
106. 颈部手术后拆线时间是 【 】
- A. 低渗性缺水 B. 等渗性缺水 C. 高渗性缺水
- D. 低钾血症 E. 高钾血症
107. 急性大量丧失消化液后, 脉搏细弱, 肢端湿冷, 血压下降 【 】
108. 高热大汗, 病人诉口渴、烦躁 【 】

医学综合全真模拟试卷(三)参考答案

- | | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|
| 1. D | 2. D | 3. D | 4. B | 5. C | 6. A |
| 7. C | 8. A | 9. C | 10. D | 11. A | 12. D |
| 13. C | 14. B | 15. E | 16. A | 17. A | 18. B |
| 19. A | 20. C | 21. D | 22. E | 23. A | 24. D |
| 25. B | 26. B | 27. C | 28. E | 29. C | 30. E |
| 31. A | 32. C | 33. A | 34. A | 35. A | 36. B |
| 37. D | 38. A | 39. C | 40. D | 41. A | 42. B |
| 43. B | 44. B | 45. C | 46. C | 47. D | 48. A |
| 49. A | 50. D | 51. B | 52. D | 53. C | 54. E |
| 55. A | 56. D | 57. A | 58. C | 59. B | 60. D |
| 61. B | 62. C | 63. D | 64. E | 65. B | 66. A |
| 67. B | 68. D | 69. D | 70. C | 71. B | 72. C |
| 73. C | 74. E | 75. C | 76. D | 77. C | 78. C |
| 79. D | 80. C | 81. D | 82. E | 83. A | 84. C |
| 85. D | 86. C | 87. B | 88. A | 89. D | 90. C |
| 91. A | 92. C | 93. A | 94. E | 95. E | 96. B |
| 97. C | 98. A | 99. C | 100. B | 101. C | 102. D |
| 103. B | 104. C | 105. E | 106. B | 107. B | 108. C |
| 109. ACDE | 110. ABDE | 111. ABD | 112. AE | 113. ABC | 114. ABCDE |
| 115. ADE | 116. ACE | 117. BD | 118. BCE | 119. ABCDE | 120. BCE |